



Tomasz Fałkowski lekarz stomatolog

GABINET:
Centrum Handlowo-Usługowe Elitt
ul. Syta 120
02-987 Warszawa (Wilanów-Zawady)

Tel. 602 334055

www.idealnyusmiech.pl
email: falkowski@idealnyusmiech.pl

PO LECZENIU ENDODONTYCZNYM

Leczenie kanałowe zostało zakończone. Proszę zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii z tym związanych:

- Nie jedz nic do momentu całkowitego ustąpienia znieczulenia. Może to potrwać 1-2 godziny. Brak odrętwienia twarzy, języka i dziąsła świadczy o ustąpieniu znieczulenia.
- Nie pij nic gorącego do momentu ustąpienia znieczulenia. Możesz natomiast w każdej chwili pić napoje zimne i o temperaturze pokojowej. Zimą okryj szalikiem znieczulony policzek, aby go nie odmrozić.
- Możesz odczuwać pewien dyskomfort związany z leczonym zębem, trwający nawet kilka dni. Jeśli w momencie ustępowania znieczulenia odczuwasz jakkolwiek ból, przyjmij od razu leki przeciwbólowe (Ibuprofen 200-400 mg, Aspiryna 500 mg). Jeśli to konieczne, kolejne dawki przyjmuj co 6-8 godzin. Jeśli po upływie 3 dni nie zmniejszają się dolegliwości – skontaktuj się ze mną (telefon, sms, email).
- Leczony ząb jest zamknięty szczelnym i trwałym kompozytem. Jest też wyłączony ze zwarcia, by zmniejszyć ryzyko jego złamania. Unikaj jednak żucia tym zębem.
- Normalne szczotkowanie i nitkowanie leczonego zęba jest jak najbardziej wskazane.
- Zwykle po leczeniu kanałowym należy odczekać pewien czas (do 4 tygodni), by upewnić się, że ząb nie sprawia kłopotów. Jeśli tylko wszystko jest w porządku, ząb powinien być jak najszybciej docelowo odbudowany wypełnieniem (plombą) lub koroną. Brak takiej odbudowy znacząco zwiększa szanse na ponowną infekcję zęba. Zwiększa też ryzyko pęknięcia zęba i jego utratę.